

## QUÈ ÉS LA TRIQUINOSI?

La triquinosi és una malaltia parasitària àmpliament difosa a nivell mundial que es transmet pels aliments i per a la qual existeixen mesures específiques de control a la normativa de la UE.

## QUINS SÓN ELS SÍMPTOMES DE LA TRIQUINOSI?

La malaltia consta d'una primera fase gastrointestinal i d'una segona fase sistèmica.

### Síntomes gastrointestinals:

vòmits, diarrea, nàusees i calfreds abdominals.

### Síntomes sistèmics:

dolor muscular i febre.

El procés es pot complicar amb quadres neurològics i cardíacs.

## QUINS SÓN ELS ALIMENTS QUE PODEN TRANSMETRE LA MALALTIA?

- > Carn crua o carn poc cuinada de porcs, porcs senglars i cavalls.
- > Embotits no sotmesos a tractament tèrmic (sobrassada, llonganissa, carn i xulla...).

**IMPORTANT: S'han de consumir carn i embotits casolans de porcs procedents de matances tradicionals o de porcs senglars de caça que s'hagin sotmès a l'anàlisi de triquina. És per a la seguretat de tots.**

## QUINS SÓN ELS COMPROMISOS DE LA CONSELLERIA DE SALUT CONSUM PER AL CONTROL DE LA TRIQUINOSI?

- > Establir mesures perquè els porcins sacrificats destinats al consum domèstic privat se sotmeten a l'anàlisi de triquina i que no es consumeixen productes de risc fins a l'obtenció del resultat favorable de l'anàlisi.
- > Controlar que la carn que surt dels escorxadors de les Illes Balears s'ha sotmès a l'anàlisi de detecció de triquina i el resultat ha estat negatiu.
- > Controlar que la carn que es comercialitza a la nostra comunitat autònoma procedeixi d'establiments autoritzats.

Per a qualsevol dubte, queixa o suggeriment podeu contactar amb nosaltres mitjançant la pàgina web [lasalutentot.caib.es](http://lasalutentot.caib.es) on també podeu trobar informació útil.



## QUINES SÓN LES MESURES DE CONTROL SANITARI DEL SACRIFICI DELS PORCS DESTINATS AL CONSUM DOMÈSTIC PRIVAT?

Les mesures de control establerts a la normativa autonòmica es basen en quatre punts:

- 1. Intervenció dels ajuntaments** a l'organització i l'aprovació de la campanya de sacrifici dels porcs destinats al consum domèstic privat.
- 2. Sotmetre la carn a l'anàlisi** de detecció de triquina.
- 3. Realització de les analítiques** de detecció de triquina pels veterinaris col·laboradors.
- 4. Supervisió del funcionament del sistema** per part de la Direcció General de Salut Pública i Participació.

**IMPORTANT:** La seguretat alimentària comença a la producció primària. És responsabilitat de tots aconseguir un elevat nivell de protecció de la salut.

## QUINES SÓN LES PASSES PERDUR A TERME L'ANALÍTICA?

> Posar-se en contacte amb l'ajuntament respectiu perquè ens informin dels veterinaris col·laboradors designats.

> Prendre dues mostres per cada pilar del diafragma de la zona de transició entre la part muscular i la part tendinosa (per a qualsevol dubte o aclariment posar-se en contacte amb el veterinari col·laborador designat per l'ajuntament).

> Lliurar la mostra al veterinari col·laborador en l'horari designat a tal efecte: quan es lliurin les mostres, a més, es proporcionarà informació de l'origen del porc (identificació de l'explotació, localització, municipi...) i dades personals de qui lliura la mostra (nom i llinatges, DNI, adreça i número de telèfon de contacte).

**IMPORTANT:** No consumir carn crua ni embotits no sotmesos a tractament tèrmic abans de l'obtenció del resultat analític.

LES MATANCES I LA TRIQUINOSI



lasalutentot.caib.es

LES MATANCES I LA TRIQUINOSI  
RESPONSABILITATS I PERILLS SANITARIS